

Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed



Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen

Redaktion: Kasper Manniche, Inge Frölich og Peter Lindholm

Grafisk tilrettelæggelse: Girafisk Design

Korrektur: Pjec1heden

Tryk: FOAs Trykkeri, oktober 2010

Indholdsfortegnelse

Side 4	Sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer
Side 7	Kvinderne har et godt helbred – mændene halter bagefter
Side 9	Rygning – FOAs medlemmer ryger mere end gennemsnittet
Side 12	FOAs kvindelige medlemmer drikker mindre end andre
Side 14	Overvægt blandt FOAs medlemmer
Side 16	FOAs kvinder har mere fysisk anstrengende arbejde end andre kvinder
Side 18	Langvarig sygdom er mest udbredt blandt mænd i Teknik- og Servicesektoren
Side 18	Forhøjet blodtryk
Side 18	Rygsygdomme er på niveau med de andre
Side 19	Lidt flere FOA-kvinder har langvarigt sygefravær end andre kvinder
Side 19	FOA-mændene bruger mere medicin end andre mænd
Side 19	FOA-mændene er oftere uønsket alene
Side 20	Tid til arbejdsopgaverne
Side 20	Følelsesmæssigt belastende situationer er udbredte blandt FOAs medlemmer
Side 22	Tunge løft hos FOA-kvinderne, dårlige arbejdsstillinger og støj
Side 22	FOA-mændene går lidt oftere til lægen end andre mænd
Side 24	Indlæggelser på hospitalet – Især FOAs mænd er mere indlagt på hospitalet end andre

Sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer

Sundhed optager danskerne mest, når vi i undersøgelser bliver spurgt om de forskellige velfærdsområder. På tværs af alder, indkomst og politisk ståsted er sundhed blevet stadig vigtigere for os. Vi måler bl.a. andet vores livskvalitet på, hvor sunde vi føler os.

Hvordan forholdet det sig, med FOA-medlemmernes sundhed i forhold til sammenlignelige grupper på arbejdsmarkedet?

For at få svar på det har FOA bedt Statens Institut for Folkesundhed (SIF) om at gennemføre en undersøgelse af FOA-medlemmernes sundhed. Undersøgelsen, som denne pjece bygger på, indgår som delelement i FOAs samlede sundhedspolitiske udspil *Sundhed for Alle*.

Undersøgelsen består af medlemmernes egne svar i de store danske sundheds- og sygelighedsundersøgelser, som gennemføres omkring hvert femte år, hvor et stort udsnit af den danske befolkning svarer på spørgsmål om deres helbred. Derudover består undersøgelsen af en opgørelse over medlemmernes kontakt til sundhedsvæsenet (læge og hospital).

I alt indgår svar fra 1.737 FOA-medlemmer, som har deltaget i sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 2000 og 2005, og der er fokus på de erhvervsaktive medlemmer i alderen 16-64 år.¹ Undersøgelsen er opdelt på svar for de enkelte sektorer i FOA.

¹ 2000 og 2005 er de nyeste undersøgelser. Der gennemføres en undersøgelse i 2010, som afrapporteres i 2011. I 2005 deltog 14.566 danskere i undersøgelsen.

Undersøgelsen forsøger så vidt muligt at sammenligne FOA-medlemmernes sundhed med andre sammenlignelige grupper i samfundet. Derfor vil de fleste resultater for FOAs medlemmer blive holdt op imod andre kvinder og mænd på det niveau, der hedder "lønmodtager på grundniveau".² Derudover kan man sammenligne resultaterne med hvad alle kvinder og mænd svarer i Danmark i rapporten.

På baggrund af SIF's undersøgelse kan man i korte træk konkludere følgende:

- Kvinderne siger selv, at de har et godt helbred, mændene halter bagefter
- Rygning - FOAs medlemmer ryger mere end gennemsnittet
- FOAs kvindelige medlemmer drikker mindre end andre kvinder
- FOAs medlemmer er i højere grad overvægtige end andre kvinder og mænd
- FOAs kvinder har mere fysisk anstrengende arbejde i forhold til andre kvinder
- Langvarig sygdom er mest udbredt blandt mænd i Teknik- og Servicesektoren
- FOAs kvinder har mere langvarigt sygefravær end andre kvinder
- Medicin – FOA-mændene bruger mere medicin end andre mænd
- Sociale relationer – FOA-mændene er oftere uønsket alene
- Følelsesmæssigt belastende situationer er mere udbredte blandt FOAs medlemmer
- FOA-kvinderne er mere udsatte for tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og støj i pædagogisk sektor
- Besøg hos praktiserende læge – FOA-mændene går lidt oftere til lægen end andre mænd
- Indlæggelser på hospitalet – både FOAs kvinder og især FOAs mænd er oftere indlagt på hospitalet end andre

² "Lønmodtager på grundniveau" er en kategori, som de fleste af FOAs medlemmer falder ind under. Det består derudover af fx af slagtere, murere, malere, frisører, politibetjente, butiksmedarbejdere, landmænd, gartnere og bagere. Der er en stor overensstemmelse mellem lønmodtager på grundniveau og de erhvervsaktive FOA medlemmernes uddannelseslængde. Endvidere forekommer der ikke væsentlige forskelle i bruttoindkomsten mellem lønmodtager på grundniveau og de erhvervsaktive FOA-medlemmer. Med hensyn til aldersfordelingen er der en større andel i aldersgruppen 16-34 år blandt lønmodtager på grundniveau end blandt FOA-medlemmerne, hvorfor der i analyserne vil blive taget højde for aldersforskel i sektorgrupperne.

Undersøgelsen dokumenterer, at FOAs medlemmer på nogle punkter ligger over gennemsnittet, når det gælder rygning og overvægt. Undersøgelsen dokumenterer også, at der er helbredsproblemer blandt FOAs mænd.

Og FOAs medlemmer er også oftere indlagt på hospitalet end andre.

Dertil kommer, at FOA-medlemmernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø adskiller sig fra andre danskeres, især hvad angår fysisk anstrengende arbejde, tunge løft m.m. FOAs medlemmer oplever i højere grad end andre følelsesmæssigt belastende situationer.

Mange af FOAs medlemmer har endvidere skiftende arbejdstider, hvilket bl.a. kan gøre det sværere at se venner og familie. Skiftende arbejdstider, og herunder nat-arbejde, kan også have en række helbredsmæssige konsekvenser. Eksempelvis ved vi, at skiftende arbejdstider betyder at man får større behov for hvile og restitution, end hvis man har fast dagarbejde.

Skiftende arbejdstider kan give også træthed, koncentrationsbesvær, lavt engagement og aktivitetsniveau samt øge risikoen for infektioner. Lange arbejdstider og korte søvnperioder kan også øge risikoen for bl.a. hjerte-/karsygdomme.

FOAs sundhedspolitiske udspil, som indeholder 70 ideer til bedre sundhed i hverdagen for borgere og medarbejdere, og som indgår i Sundhed for Alle, skal ses i sammenhæng med denne undersøgelse. De mange ideer har til formål både at hjælpe borgerne til et sundere liv, men også at inspirere vores medlemmer til selv at leve et sundere liv, når de hjælper andre.

Kvinderne har et godt helbred – mændene halter bagefter

Fire ud af fem af de kvindelige erhvervsaktive FOA-medlemmer vurderer, at de har et virkelig godt eller godt helbred. Det viser SIF's undersøgelse. Det svarer nogenlunde til, hvad andre kvinder i Danmark i gennemsnit siger.

Fra 2000 til 2005 er der sket en stigning i andelen af kvindelige FOA-medlemmer, der vurderer eget helbred som værende virkelig godt eller godt.

Blandt erhvervsaktive mænd i Teknik- og Servicesektoren er der 71 procent, der vurderer, at de har et virkelig godt eller godt helbred. Det er 14 procent færre end andre mandlige lønmodtagere på grundniveau.

SIFs undersøgelse viser desuden, at 87 procent af de kvindelige FOA medlemmer føler, at de for det meste er friske nok til at gøre det, de har lyst til. Det svarer omtrent til niveauet for andre kvinder i Danmark.

Andel med virkelig godt eller godt selv vurderet helbred (%) blandt 16-64 årige erhvervsaktive samt sammenligning (SFR1) af FOA medlemmer med lønmodtagere på grundniveau. Gennemsnit for årene 2000 og 2005

	%	SFR ¹
FOA i alt	82,8	
Kvinder		
Kost- og Servicesektor	81,2	0,96
Pædagogisk Sektor	83,0	0,98
Social- og Sundhedssektor	83,9	0,99
FOA	83,5	0,98
Lønmodtager grundniveau	85,7	1
Danmark	86,3	
Mænd		
Teknik- og Servicesektor	70,7	0,86*
FOA	77,8	0,93
Lønmodtager grundniveau	85,6	1
Danmark	86,9	

¹ Forholdet mellem det observerede og forventede antal.

Tabel 2.1, Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer ud arbejdet af SIF for FOA, 2010.

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der er tages højde for aldersforskelle

Rygning – FOAs medlemmer ryger mere end gennemsnittet

Rygning anses for at være den mest afgørende faktor for danskernes lave middellevetid. Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, hvor først og fremmest lungekræft, hjerte-kar-sygdomme samt kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er de dominerende. I Danmark er rygning en medvirkende faktor til knap 14.000 dødsfald om året, hvilket svarer til hvert fjerde dødsfald. Beregninger har vist, at rygere lever 7-10 år kortere end aldrig-rygere. Der ses en tendens til, at antallet af danske dagligrygere har været faldende gennem en årrække. Dog er andelen af rygere i Danmark stadig større end gennemsnittet i andre nordiske lande.

Kilde: "Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer", SIF 2010

SIF's undersøgelse viser, at 42 procent af de kvindelige FOA-medlemmer ryger hver dag. Når der tages højde for aldersforskelle mellem grupperne, er der 24 procent flere kvindelige FOA-medlemmer, der ryger dagligt, end blandt lønmodtager på grundniveau.

Til sammenligning ryger knap 30 procent af danske kvinder som helhed. SIF's undersøgelse dokumenterer desuden, at der er ret markante forskelle i andelen af kvindelige dagligrygere mellem sektorerne.

I Kost- og Servicesektoren ryger halvdelen af medlemmerne (49 procent). Når man tager højde for alder m.m., så er det 48 procent mere end "lønmodtagerne på grundniveau" som helhed.

Andel af dagligrygere (%) blandt 16-64 årige erhvervsaktive samt sammenligning (SFR) af FOA medlemmer med lønmodtagere på grundniveau. Gennemsnit for årene 2000 og 2005

	%	SFR ¹
FOA i alt	42,6	
Kvinder		
Kost- og Servicesektor	48,8	1,48 *
Pædagogisk Sektor	34,3	1,00
Social- og Sundhedssektor	45,3	1,33 *
FOA	42,3	1,24 *
Lønmodtager grundniveau	34,1	1
Danmark	29,6	
Mænd		
Teknik- og Servicesektor	45,1	1,10
FOA	45,1	1,11
Lønmodtager grundniveau	40,2	1
Danmark	33,4	

¹ Forholdet mellem det observerede og forventede antal.

Tabel 2.1, Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer ud arbejdet af SIF for FOA, 2010.

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der er tages højde for aldersforskelle

Blandt kvinder i Social- og Sundhedssektoren er der 45 procent dagligrygere.

Kvinderne i Pædagogisk Sektor ryger lige så meget som andre kvindelige lønmodtager på grundniveau.

45 procent af FOAs mænd ryger. Det skal ses i forhold til, at 40 procent af de mandlige lønmodtager på grundniveau ryger, og 33 procent af alle mænd ryger. Når der tages højde for aldersforskelle mm. så er der dog ingen tydelige forskelle i FOA-mændenes rygevaner.

SIF har undersøgt omfanget af storrygere, dvs. dem der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Når der tages højde for aldersforskelle, er der blandt kvindelige FOA-medlemmer 27 procent flere storrygere end blandt lønmodtager på grundniveau. I Kost- og Servicesektoren er der 64 procent flere storrygere end blandt lønmodtager på grundniveau. Og i Social- og Sundhedssektoren er der 27 procent flere storrygere end blandt lønmodtager på grundniveau. I perioden 2000-2005 faldt andelen af storrygere i Danmark, mens den steg blandt FOAs medlemmer.

FOAs kvindelige medlemmer drikker mindre end andre

Der er store helbredsmæssige konsekvenser relateret til et stort alkoholforbrug. Forbruget af alkohol har, på samme måde som rygning, været en medvirkende årsag til den stagnerende middellevetid op gennem 1990'erne. Hvert år dør cirka 3.000 danskere med en alkoholrelateret diagnose, svarende til 5 % af alle dødsfald. Personer med stort alkoholforbrug har højere dødelighed og sygelighed end personer med moderat eller intet forbrug. Personer uden alkoholforbrug har den samme risiko for sygelighed og dødelighed som personer med et moderat alkoholforbrug.

Kilde: "Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer", SIF 2010

7 procent af FOAs kvindelige medlemmer har overskredet Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse (14 genstande) inden for den seneste uge. Det viser SIF's undersøgelse. Til sammenligning overskrides grænsen af 9 procent af de kvindelige lønmodtagere på grundniveau og 10 procent af alle danske kvinder.

Når der tages højde for aldersforskelle m.m., drikker 23 procent færre FOA-kvinder mindre end andre kvindelige lønmodtagere på grundniveau. I Social- og Sundhedssektoren er der 24 procent færre kvinder, der har overskredet Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse inden for den seneste uge, end blandt kvindelige lønmodtagere på grundniveau.

SIFs undersøgelse viser dog også, at der er sket en stigning i antallet af kvinder, der drikker mere, og tilsvarende tendens kan man også se blandt FOAs medlemmer.

Mændene i FOA drikker omtrent lige så meget som øvrige mænd (der er ikke nogle statistiske forskelle).

Andel, der har overskredet Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse inden for den seneste uge (%) blandt 16-64 årige erhvervsaktive samt sammenligning (SFR) af FOA medlemmer med lønmodtagere på grundniveau.

Gennemsnit for årene 2000 og 2005

	%	SFR ¹
FOA i alt	8,3	
Kvinder		
Kost- og Servicesektor	11,5	1,07
Pædagogisk Sektor	6,6	0,72
Social- og Sundhedssektor	7,2	0,76*
FOA	7,3	0,77*
Lønmodtager grundniveau	8,9	1
Danmark	9,9	
Mænd		
Teknik- og Servicesektor	20,9	1,23
FOA	15,2	0,91
Lønmodtager grundniveau	16,5	1
Danmark	16,4	

¹ Forholdet mellem det observerede og forventede antal.

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der er tages højde for aldersforskelle

Overvægt blandt FOAs medlemmer

Andelen af svært overvægtige udgør et stadig stigende folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Svær overvægt øger risikoen for en lang række af de store folkesygdomme som hjerte-karsygdomme, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og belastningslidelser i bevægeapparatet. Der findes en arvelig disposition for fedme, men den stigende andel af svært overvægtige i den danske befolkning må først og fremmest sættes i relation til det faldende fysiske aktivitetsniveau og til det stigende fedtindhold i kosten.

Kilde: "Sundhedstilstanden blandt FOA medlemmer", SIF 2010

Ifølge SIF's undersøgelse er 42 procent af de kvindelige FOA-medlemmer overvægtige. Blandt danske kvinder som helhed er 31 procent overvægtige og blandt kvindelige lønmodtager på grundniveauer det 32 procent.³

Når der tages hensyn til aldersforskelle er 25 procent af FOAs kvindelige medlemmer overvægtige i forhold til "lønmodtagergruppen på grundniveau".

I Kost- og Servicesektoren er halvdelen af medlemmerne (50 procent) overvægtige.

Der er sket en stigning i andelen af kvinder i Danmark, der er overvægtige fra 2000 til 2005. Det viser SIFs undersøgelse. Den samme tendens ses blandt kvindelige FOA-medlemmer.

Også når SIF ser på svær overvægt, ligger FOAs medlemmer højere end gennemsnittet. 14 procent af FOAs medlemmer er svært overvægtige, mod 9 procent af

³ Overvægt måles ud fra BMI, som er = vægt (kg)/højde (m)² Har man et BMI på mellem 25 og 30, så er man overvægtig, har man BMI på over 30 er man svært overvægtig (kilde SFI).

danske kvinder som helhed. Og der er tilsyneladende også sket en stigning i antallet af overvægtige fra 2000 til 2005 både blandt danske kvinder som helhed og FOAs kvinder.

Andel overvægtige (%) blandt 16-64 årige erhvervsaktive samt sammenligning (SFR) af FOA medlemmer med lønmodtagere på grundniveau. Gennemsnit for årene 2000 og 2005

	%	SFR ¹
FOA i alt	43,6	
Kvinder		
Kost- og Servicesektor	49,5	1,39*
Pædagogisk Sektor	40,5	1,23*
Social- og Sundhedssektor	41,6	1,24*
FOA	42,0	1,25*
Lønmodtager grundniveau	32,4	1
Danmark	30,6	
Mænd		
Teknik- og Servicesektor	64,4	1,04
FOA	54,6	0,93
Lønmodtager grundniveau	54,9	1
Danmark	48,6	

1 Forholdet mellem det observerede og forventede antal.

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der tages højde for aldersforskelle

FOAs kvinder har mere fysisk anstrengende arbejde end andre kvinder

To ud af tre kvindelige FOA-medlemmer har et job, som kan karakteriseres som fysisk anstrengende (stående/gående eller tungt/hurtigt anstrengende arbejde). Samme niveau er for danske kvinder som helhed 29 procent og lønmodtager på grundniveau 30 procent.

Når der tages højde for aldersforskelle i grupperne er der ifølge SIF's undersøgelse over dobbelt så mange FOA-kvinder som kvindelige lønmodtagere på grundniveau, der har fysisk anstrengende arbejde i hovedbeskæftigelsen.

Blandt mændene er der ikke nogen forskel, når der tages højde for aldersforskelle.

SIF's undersøgelse viser, at der er sket et fald i andelen af kvindelige FOA-medlemmer, der har fysisk anstrengende arbejde i hovedbeskæftigelsen fra 2000 til 2005. Der er sket en stor stigning fra 2000 til 2005 i andelen af kvindelige FOA-medlemmer, der dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet i fritiden. Det betyder, at FOA-medlemmerne i 2005 næsten dyrker lige så meget fysisk anstrengende motion som andre kvindelige lønmodtagere på grundniveau.

SIF's undersøgelse viser også, at samtidig med, at flere er blevet fysisk aktive i fritiden, er der færre, der har stillesiddende fritidsaktiviteter.

Andel med fysisk anstrengende arbejde i hovedbeskæftigelsen (%) blandt 16-64 årige erhvervsaktive samt sammenligning (SFR) af FOA medlemmer med lønmodtagere på grundniveau. Gennemsnit for årene 2000 og 2005

	%	SFR ¹
FOA i alt	65,7	
Kvinder		
Kost- og Servicesektor	64,5	2,66*
Pædagogisk Sektor	64,0	2,20*
Social- og Sundhedssektor	71,2	2,55*
FOA	68,2	2,43*
Lønmodtager grundniveau	30,2	1
Danmark	28,5	
Mænd		
Teknik- og Servicesektor	40,2	0,77
FOA	48,9	0,92
Lønmodtager grundniveau	55,1	1
Danmark	34,1	

1 Forholdet mellem det observerede og forventede antal.

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der tages højde for aldersforskelle

Langvarig sygdom er mest udbredt blandt mænd i Teknik- og Servicesektoren

En tredjedel af FOAs kvinder har en langvarig sygdom (dvs. længere end et halvt år). Det er omtrent det samme som for øvrige kvinder i Danmark.

Blandt mændene i Teknik- og Servicesektoren oplyser over halvdelen af mændene (55 procent), at de har en langvarig sygdom. Det er mere end øvrige danske mænd, hvor gennemsnittet ligger på 32 procent. Når man tager højde for aldersforskelle, så har 60 procent flere mænd i Teknik- og Servicesektoren langvarig sygdom, end andre mænd i kategorien lønmodtager på grundniveau.

Forhøjet blodtryk

I alt 8 procent af de kvindelige FOA-medlemmer oplyser, at de har forhøjet blodtryk, hvor andelen blandt kvindelige lønmodtagere på grundniveau er 6 procent. I 2005 er der 93 procent flere kvindelige FOA-medlemmer, der oplyser, at de har forhøjet blodtryk end i 2000.

Rygsygdomme er på niveau med de andre

Ifølge SIF's undersøgelse oplyser 12 procent af de kvindelige FOA medlemmer, at de har en rygsygdom. Det er på næsten samme niveau som lønmodtagere på grundniveau og danske kvinder som helhed. Blandt de mandlige FOA-medlemmer oplyser 16 procent, at de har en rygsygdom, mens 14 procent af lønmodtagere på grundniveau oplyser at have en rygsygdom. Andelen med rygsygdom blandt kvin-

der i Danmark er steget i perioden 2000 til 2005. Den samme tendens ses blandt kvindelige FOA-medlemmer.

Lidt flere FOA-kvinder har langvarigt sygefravær end andre kvinder

SIF's undersøgelse viser, at 9 procent af FOA-kvinderne har haft langvarigt sygefravær inden for det seneste år (mere end 25 sygedage). Når man ser på danske kvinder som helhed, er der 6 procent. Hvis man korrigerer for alder, så er der 48 procent flere af de kvindelige FOA-medlemmer, der oplyser at de har haft langvarigt sygefravær inden for det seneste år, end øvrige danske kvinder på lønmodtager-grundniveau.

FOA-mændene bruger mere medicin end andre mænd

Blandt mændene i Teknik- og Servicesektoren er det 46 procent. Hvis man ser på lønmodtagere på grundniveau og øvrige danske mænd, så bruger 20 procent af dem regelmæssigt medicin.

Blandt de kvindelige FOA medlemmer bruger 30 procent regelmæssigt medicin. 38 procent af de mandlige FOA-medlemmer bruger regelmæssigt medicin.

FOA-mændene er oftere uønsket alene

Blandt de mandlige FOA-medlemmer er 19 procent ofte eller en gang imellem

uønsket alene. Når man tager højde for aldersforskelle, så er det 58 procent flere end blandt lønmodtagere på grundniveau.

SIF's undersøgelse viser, at 14 procent af kvinderne i FOA ofte eller en gang imellem er uønsket alene. Blandt øvrige danske kvinder og lønmodtagere på grundniveau er det 16 procent.

Tid til arbejdsopgaverne

14 procent af FOAs kvindelige medlemmer oplever ofte eller altid, at de ikke når deres arbejdsopgaver. Det viser SIF's undersøgelse. Blandt kvinder på lønmodtager grundniveau er det samme tal 21 procent, og blandt alle kvinder i Danmark er det hver fjerde (25 procent), som ofte eller altid ikke når alle deres arbejdsopgaver.

Blandt mændene i FOAs Teknik- og Servicesektor oplever 27 procent, at de ofte eller altid ikke når alle deres arbejdsopgaver. Det samme tal for mandlige lønmodtagere på grundniveau er 19 procent og 29 procent for alle mænd.

Følelsesmæssigt belastende situationer er udbredte blandt FOAs medlemmer

En fjerdedel af de kvindelige FOA-medlemmer angiver, at de altid eller ofte bliver bragt i følelsesmæssigt belastende situationer. Blandt lønmodtagere på grundniveau er det 13 procent og blandt danske kvinder som helhed er det samme tal 18 procent.

Når man renser for aldersforskelle er det 85 procent flere af FOA-kvinderne end

Andel der altid eller ofte bliver bragt i følelsesmæssigt belastende situationer (%) blandt 16-64 årige erhvervsaktive samt sammenligning (SFR) af FOA medlemmer med lønmodtagere på grundniveau. Gennemsnit for årene 2000 og 2005

	%	SFR ¹
FOA i alt	24,0	
Kvinder		
Kost- og Servicesektor	17,6	1,23
Pædagogisk Sektor	20,9	1,58*
Social- og Sundhedssektor	27,5	2,04*
FOA	24,9	1,85*
Lønmodtager grundniveau	12,9	1
Danmark	18,0	
Mænd		
Teknik- og Servicesektor	16,0	1,60
FOA	17,7	1,85*
Lønmodtager grundniveau	9,1	1
Danmark	12,4	

1 Forholdet mellem det observerede og forventede antal.

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der tages højde for aldersforskelle

lønmodtagere på grundniveau, der altid eller ofte bliver bragt i følelsesmæssigt belastende situationer. Det gør sig især gældende i Social- og Sundhedssektoren. Også FOA-mændene bringes ofte eller altid i følelsesmæssigt belastede situationer.

Tunge løft hos FOA-kvinderne, dårlige arbejdsstillinger og støj

Der er over dobbelt så mange kvindelige FOA-medlemmer end blandt lønmodtagere på grundniveau, der mere end to dage om ugen bærer eller løfter tunge byrder. 59 procent af FOAs kvindelige medlemmer siger, at de mere end to dage om ugen bærer eller løfter tunge byrder. Samme tal for danske kvinder er 26 procent og 28 procent for kvindelige lønmodtagere på grundniveau.

Der er mere end dobbelt så mange FOA-kvinder end kvindelige lønmodtagere på grundniveau, der angiver, at de arbejder mere end to dage om ugen i bøjede eller forvredne stillinger. Her er der dog sket et fald på 16 procent fra 2000 til 2005 for FOAs kvinder.

I alt oplyser 2 ud af 3 medlemmer af FOAs Pædagogiske Sektor, at de er udsat for støj, så de må hæve stemmen. Det er dobbelt så mange som øvrige kvinder på lønmodtager grundniveau og danske kvinder som helhed.

FOA-mændene går lidt oftere til lægen end andre mænd

SIF har undersøgt hvor mange gange FOAs medlemmer besøger de alment prakti-

serende læger om året. Det er i gennemsnit 10,3 gange pr. år blandt kvinderne og 7,6 gange for mændene. Kvinderne ligger på niveau med andre kvinder i Danmark.

Når der korrigeres for aldersforskelle i grupperne, er der 20 procent flere besøg blandt mandlige FOA-medlemmer, der har været hos alment praktiserende læge, end blandt lønmodtagere på grundniveau. Blandt mænd i Teknik- og Servicesektoren er der 32 procent flere, der har været hos alment praktiserende læge, end blandt lønmodtagere på grundniveau.

Indlæggelser på hospitalet – især FOAs mænd er mere indlagt på hospitalet

Hver gang der indlægges 1000 kvinder på hospitalet er 78 FOA-kvinder. Kvindelige lønmodtagere ligger på 68 indlæggelser ud af 1000.

Når der korrigeres for forskelle i alder, BMI og rygning i grupperne er indlæggelsesraten blandt kvinder i Social- og Sundhedssektoren 23 procent større end blandt kvindelige lønmodtagere på grundniveau.

FOA-mændene indlægges 94 gange ud af 1000 indlæggelser. Mandlige lønmodtagere ligger på 63.

Indlæggelsesraten blandt mandlige FOA-medlemmer er 41 procent større end blandt lønmodtagere på grundniveau, når der korrigeres for forskelle i alder, BMI og rygning i grupperne.

Heldøgnsindlæggelser i en fem års periode blandt 16-64 årige erhvervsaktive FOA medlemmer, kontrolleret for alder, BMI og rygning

	Rate	Kontrolleret for alder		Kntrolleret for alder, BMI og rygning	
		Relativ rate	95% sikkerhedsgrænse	Relativ rate ¹	95% sikkerhedsgrænse
FOA i alt	79,3				
Kvinder					
Kost- og Servicesektor	91,2	1,33	(0,90-1,98)	1,24	(0,83-1,86)
Pædagogisk Sektor	62,7	0,92	(0,74-1,14)	0,92	(0,74-1,14)
Social- og Sundhedssektor	85,7	1,26*	(1,09-1,45)	1,23*	(1,06-1,42)
FOA	78,2	1,15*	(1,01-1,30)	1,12	(0,99-1,27)
Lønmodtager grundniveau	68,1	1		1	
Mænd					
Teknik- og Servicesektor	90,9	1,27	(0,84-1,93)	1,28	(0,85-1,95)
FOA	93,6	1,39*	(1,07-1,82)	1,41*	(1,08-1,84)
Lønmodtager grundniveau	63,1	1		1,0	

* betyder, at forskellen er statistisk forskellig fra kontrolgruppen "lønmodtager på grundniveau" når der tages højde for aldersforskelle

Raten for ambulante kontakter blandt kvindelige FOA-medlemmer er 228 kontakter pr. 1000 personer pr. år. Blandt mandlige FOA-medlemmer er raten for kontakter 191 kontakter pr. 1000 personer pr. år. Når der korrigeres for forskelle i alder, BMI og rygning i grupperne er der 11 procent flere kontakter blandt kvinder i Social- og Sundhedssektoren end blandt lønmodtagere på grundniveau. Raten for skadestuekontakter blandt kvindelige FOA medlemmer er 73 kontakter pr. 1000 personer pr. år, mens raten for skadestuekontakter blandt mandlige FOA-medlemmer er 134 indlæggelser pr. 1000 personer pr. år.



Stauings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk